

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°

du

193

3 Avril 1991


ARBRES FRUITIERS

Arbres à noyaux


Pucerons, Acariens, Tordeuses orientales, Monilia

VIGNE : ExcorioseCULTURES MARAICHÈRES : Fraisiers

Botrytis



** Attention aux abeilles **



ARBRES FRUITIERS

PECHERS

Les colonies de pucerons noirs et verts commencent à se manifester maintenant. Attendre la chute des pétales pour intervenir avec un Aphicide tels que : DECIS, FASTAC, KLARTAN, ORTHENE 50, ORTHOTOX, SUMICIDIN, TAMARON. Les traitements d'hiver sont les plus efficaces contre les myzus.

La cloque peut encore se traiter sur des arbres dont les feuilles sont en cours d'étalement. Ailleurs c'est inutile.

**

Acariens

Les premières éclosions s'observent souvent aux mêmes endroits du verger pour s'étendre ensuite. Surveiller son verger pour ne pas être pris au dépourvu. L'Apollo et le César peuvent être employés.

P10

**** Tordeuses Orientales**

On enregistre les premières captures de ce petit papillon dont les chenilles attaqueront d'abord les pousses en provoquant leur dessèchement, puis les fruits. Il est trop tôt pour intervenir.

PRUNIERS

**** Pucerons**

Surveiller ces parasites qui commencent à apparaître

**** Monilia**

tardive.

Renouveler le traitement sur les variétés dont la floraison est

ABRICOTIERS

**** Oidium**

Les jeunes fruits sont sensibles jusqu'au durcissement du noyau : Utiliser AFUGON, SAPROL, SYSTANE 12 E, TOPAZE et soufre.

VIGNE

**** Excoriose**

Le stade D est atteint et parfois le stade E pour les cépages précoces.

Si les traitements d'hiver n'ont pu être réalisés, vous pouvez intervenir avec un fongicide de contact ou de surface



D

Sortie des feuilles

Apparition des feuilles rudimentaires rassemblées en rosette, dont la base est encore protégée par la « bourre », progressivement rejetée hors des écailles.



E

Feuilles étalées

Premières feuilles totalement dégagées présentant les caractères variétaux. Sarment herbacé nettement visible.

- Dichlofluanide)
- Dithion)
- Folpel)
- Mancozébe)
- Manébe)
- Soufre)

Deux applications à
10 jours d'intervalle.

On peut aussi intervenir, mais une seule fois avec PHosethyl d'Al


CULTURES MARAÎCHÈRES

**** Fraisiers**

Les fraisiers de plein champ parvenus en floraison doivent recevoir un traitement antibotrytis avec EUPARENE 2 kg/ha, RONILAN 2 kg/ha, SUMISCLEX 1,5 kg/ha.

**** Acariens**

Vérifier ou faites examiner les feuilles par le S.R.P.V. pour déceler la présence d'acariens avant le grossissement des fruits.



=====

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°
du 193
3 Avril 1991


ARBRES FRUITIERS

Arbres à noyaux


Pucerons, Acariens, Tordeuses orientales, Monilia

VIGNE : Excoriose

CULTURES MARAICHÈRES : Fraisiers
Botrytis



** Attention aux abeilles **



ARBRES FRUITIERS

PECHERS

Les colonies de pucerons noirs et verts commencent à se manifester maintenant. Attendre la chute des pétales pour intervenir avec un Aphicide tels que : DECIS, FASTAC, KLARTAN, ORTHENE 50, ORTHOTOX, SUMICIDIN, TAMARON. Les traitements d'hiver sont les plus efficaces contre les myzus.

La cloque peut encore se traiter sur des arbres dont les feuilles sont en cours d'étalement. Ailleurs c'est inutile.

** Acariens

Les premières éclosions s'observent souvent aux mêmes endroits du verger pour s'étendre ensuite. Surveiller son verger pour ne pas être pris au dépourvu. L'Apollo et le César peuvent être employés.

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur - Gérant : J.C. COQUET

Abonnement Annuel :
Régisseur de Recettes

Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD

ISSN
C7 39 - 9633

711

**** Tordeuses Orientales**

On enregistre les premières captures de ce petit papillon dont les chenilles attaqueront d'abord les pousses en provoquant leur dessèchement, puis les fruits. Il est trop tôt pour intervenir.

PRUNIER

**** Pucerons**

Surveiller ces parasites qui commencent à apparaître

**** Monilia**

Renouveler le traitement sur les variétés dont la floraison est tardive.

ABRICOTIERS

**** Oidium**


Les jeunes fruits sont sensibles jusqu'au durcissement du noyau : Utiliser AFUGON, SAPROL, SYSTANE 12 E, TOPAZE et soufre.

VIGNE

**** Excoriose**

Le stade D est atteint et parfois le stade E pour les cépages précoces.

Si les traitements d'hiver n'ont pu être réalisés, vous pouvez intervenir avec un fongicide de contact ou de surface



D

Sortie des feuilles

Apparition des feuilles rudimentaires rassemblées en rosette, dont la base est encore protégée par la « bourre », progressivement rejetée hors des écailles.



E

Feuilles étalées

Premières feuilles totalement dégagées présentant les caractères variétaux. Sarment herbacé nettement visible.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Dichlofluanide) | |
| - Dithion) | |
| - Folpel) | |
| - Mancozèbe) | Deux applications à |
| - Manébe) | 10 jours d'intervalle. |
| - Soufre) | |

On peut aussi intervenir, mais une seule fois avec PHosethyl d'Al


CULTURES MARAÎCHÈRES

**** Fraisiers**

Les fraisiers de plein champ parvenus en floraison doivent recevoir un traitement antibotrytis avec EUPARENE 2 kg/ha, RONILAN 2 kg/ha, SUMISCLEX 1,5 kg/ha.

**** Acariens**

Vérifier ou faites examiner les feuilles par le S.R.P.V. pour déceler la présence d'acariens avant le grossissement des fruits.



=====